

Kičica

***Centaurium umbellatum* Gilib. (L.)**

sinonim *C. erythraea*, *Erythraea centaurium*



LEKOVITI DEO BILJKE (DROGA)

Koristi se nadzemni deo biljke u cvetu (*Centaurii herba*). Veoma je gorkog ukusa.

Sakuplja se od jula do kraja avgusta, dok je u cvetu. Ne sme se čupati, već se pažljivo odsecaju gornje polovine stabljike. Ne smeju se seći donji odrvenjeni delovi, jer takva droga nije kvalitetna.

Vezana u male bukete, suši se u hladu na promaji, ili u sušarama na temperaturi do 50 °C. Pakuje se i čuva prema opštim propisima. Droga mora da zadrži lepu rozikasto-crvenu boju cvetova.

BOTANIČKI OPIS

Jednogodišnja ili dvogodišnja zeljasta biljka do 50 cm visine. U gornjem delu razgranata, sa eliptičnim prizemnim lišćem, postavljenim u rozetu. Cvetići su sitni, crvenkaste boje, sakupljeni u zbijene cvasti štitastog oblika na vrhu četvorouglaste stabljike i grančica. Cveti od jula do septembra.

RASPROSTRANJENOST

Srednja i južna Evropa uključujući Mediteran, Kavkaz. Raste u svetlim šumama, kraj puteva, po njivama i vlažnim brdskim i planinskim livadama. Rasprostranjena je od nizije do planinskih pojava (do 1400m nadmorske visine). Javlja se u hrastovim šumama, pored puteva i njiva. Mestimično je ima u velikim količinama.

HEMIJSKI SASTAV

Sadrži sekoiridoidne monoterenske glukozide (genciopikrin, sverozid, svercijamarin, centapikrin), ksantone (eustomin, demetileustomin), piridinske alkaloidne (gencijanin, gencijanidin), fenolne kiseline, flavonoide, terpenoide, masne kiseline.

DELOVANJE I UPOTREBA

Gorko sredstvo (*amarum purum*). Koristi se za poboljšanje apetita, u terapiji anoreksije, hronične dispepsije i ahilije. U preparatima za žuč i jetru.