



LEKOVITI DEO BILJKE (DROGA)

Kao droga koristi se ceo ili usitnjen, osušen, vršni deo biljke u cvetu - *Alchemillae herba*. Postoji dosta vrlo sličnih vrsta, koje je veoma teško razlikovati od vrste *A. vulgaris*. Sve se mogu koristiti. Tokom sakupljanja treba obratiti pažnju da se uzima što manje primesa, okolne trave i sl. Nakon sakupljanja i sušenja obavezno je prečišćavanje, da bi se uklonile neželjene nečistoće.

U poslednje vreme se sve više traži na tržištu, ali samo čista i lepo osušena droga, koja je zadržala lepu zelenkastu boju.

BOTANIČKI OPIS

Zeljasta biljka visine 0,1-0,4 m. Donji listovi na dugačkim peteljkama, okruglasti, sa 7-11 režnjeva, koji zalaze do četvrtine ili najviše do polovine dubine liske, po celom obodu nazubljeni. Listovi stabljike su sitniji. Listovi su goli ili malo dlakavi, sa naličja uvek goli. Cvasti terminalne, sa puno cvetova žućkasto zelenkaste boje. Cveti od maja do septembra. Postoji dosta sličnih vrsta koje je teško razlikovati.

RASPROSTRANJENOST

Planine srednje i južne Evrope, Skandinavija, Sibir. Raste po vlažnim livadama, retkim šumama, pašnjacima, pored potoka isključivo u planinskim oblastima.

NAPOMENA

Ne sakupljaju se vrste koji imaju duboko deljene režnjeve (do samog centra liske).

HEMIJSKI SASTAV

Droga sadrži 6-8% tanina, flavonoide.

DELOVANJE I UPOTREBA

Deluje kao adstringens. Koristi se uglavnom u narodnoj medicini protiv blagih, nespecifičnih proliva, kao i kod nekih ginekoloških poremećaja (menoragija). Čest sastojak tzv. ženskih čajeva.