

Vranilovka

Origanum vulgare (L.)



LEKOVITI DEO BILJKE (DROGA)

Kao droga se koristi nadzemni deo biljke u cvetu - *Origani herba*. Droga je prijetnog, aromatičnog mirisa i gorkog i oporog ukusa.

Sakupljaju se vršnih 25 - 30 cm biljke u cvetu uglavnom tokom jula i avgusta. Bere se ručno, srpom, a na bogatijim nalazištima se može i kositi. Ne treba brati biljku sa belim cvetovima.


Sakupljena biljna sirovina se vezuje u bukete i suši na promaji u hladu. Pakuje se u papirne ili jutane džakove i čuva u čistim, suvim i zamračenim magacinima.

HEMIJSKI SASTAV

Etarsko ulje (dominantni timol i karvakrol), flavonoidi (naringin, luteolin, apigenin, peonidin), rozmarinska, kafena i protokatehinska kiselina, tanini.

DELOVANJE I UPOTREBA

Deluje je kao antiseptik, blag spazmolitik, ekspektorans, stomahik i tonik. Koristi se kod bolesti disajnih organa (kašalj, bronhitis), organa za varenje (posebno kod proliva) i kod infekcija urinarnog trakta.



BOTANIČKI OPIS

Višegodišnja zeljasta biljka, visine do 70 cm sa horizontalnim rizomom. Stabljika je uspravna tamnozeleno, često mrkocrvena do ljubičasta. Listovi su sa lisnom drškom, jajasti, celi po obodu, prekriveni žlezdama na licu i naličju. Cvetovi su složeni u sedeće dihazije, smeštene u terminalne i pazušne prividne klasiće, koji zajedno daju izgled metlice. Krunica je karmincvena do tamnocrvena. Plod je glatka mrka orašica. Cveti od jula do septembra.

RASPROSTRANJENOST

Umereni pojas Evroazije. Raste na sušnim obroncima, siromašnim livadama, u svetlim listopadnim šumama do 2000 m nadmorske visine.